

Параметрические и непараметрические методы в медицинской статистике

А.Н. Герасимов (andr-gerasim@yandex.ru), Н.И. Морозова (n.iv.morozova@mail.ru)

ГОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Резюме

Статья посвящена условиям применимости параметрических и непараметрических методов, включая критику частых методических ошибок. При использовании методов параметрической статистики часто основываются на неправильном посыле, что для проверки применимости методов параметрической статистики нужно выяснить, имеются ли достоверные отличия полученного экспериментального распределения от нормального. Делать этого не следует, так как любой встречающейся в биомедицинских исследованиях показатель распределен заведомо ненормально.

Кроме того, для практического применения методов параметрической статистики достаточно близости к нормальному не исходного распределения, а среднего арифметического из имеющегося набора наблюдений. В статье указано, при каких случаях и при каком объеме наблюдений можно использовать методы параметрической статистики и как это связано с величиной коэффициента эксцесса, а также каковы величины погрешности расчета достоверности отличий при использовании методов параметрической статистики.

Критическому разбору подвергаются и методы непараметрической статистики. При их большей формальной точности и широте применимости они, однако, проверяют менее ценные статистические гипотезы, так как фактически работают не с величинами, а с их рангами, а при ранжировании значительная часть информации пропадает.

Ключевые слова: методы параметрической статистики, методы непараметрической статистики, проверка статистических гипотез, статистический анализ медицинских данных

Parametric and Nonparametric Methods in Medical Statistics

A.N. Gerasimov (andr-gerasim@yandex.ru), N.I. Morozova (n.iv.morozova@mail.ru)

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, State Educational Institution of Higher Professional Training of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Abstract

The article is devoted to the conditions of applicability of parametric and nonparametric methods, including criticism of frequent methodological errors. By using methods of parametric statistics often make the wrong conclusion that to test the applicability of methods of parametric statistics need to find out whether there are significant differences resulting from the normal allocation of the pilot. Doing this is not necessary, as any encountered in biomedical research component is distributed clearly abnormal.

Besides, for the practical application of parametric statistics need sufficient proximity to the source distribution is not normal, and the arithmetic mean from a set of observations. The article stated, under any circumstances and for any amount of observational techniques can be used parametric statistics and how it relates to the value of kurtosis, and what the margin of error calculation of significant differences when using methods of parametric statistics.

Subjected to a critical analysis and methods of nonparametric statistics. With their more formal precision and breadth of applicability, however, they checked less valuable statistical hypothesis, as in fact do not work with the values, and their ranks, and the ranking much of the information is lost.

Key words: parametric statistical methods, methods of nonparametric statistics, statistical hypothesis testing, statistical analysis of medical data

Один из частых вопросов относительно статистического анализа: какие методы использовать – параметрические или непараметрические и, кстати, чем они отличаются? Параллельное их использование говорит начинающему исследователю, что и у тех, и у других методов есть свои плюсы и минусы, однако разобраться в этом не так легко. Так, прочтя, что параметрические методы можно использовать только для нормально распределенных случайных

величин, многие начинают проверять имеющиеся у них распределения на нормальности и, если получены статистически достоверные отличия, то используют непараметрические методы, а если нет – непараметрические.

Данная проверка неверна по следующим причинам:

1. Невозможно доказать, что имеющиеся наблюдения получены от нормальной случайной величины. Подобная проверка может лишь выявить

ненормальность, тогда как нормальность доказать нельзя.

2. Так как любая фактически наблюдаемая случайная величина распределена не вполне нормально, то при достаточно большом количестве наблюдений будет получено ее статистически достоверное отличие от нормального распределения. Поэтому проверка на нормальность показывает лишь одно – достаточно ли велико отличие наблюдаемой случайной величины от нормальной, чтобы это можно было показать на имеющемся объеме наблюдений.
3. Для того чтобы доказать ненормальность распределения подавляющего большинства фактических данных, проводить их статистический анализ не нужно, так как нормально распределенные случайные величины с ненулевой вероятностью должны принимать значения из любого промежутка. В том числе с ненулевой вероятностью должны наблюдаться и отрицательные значения, следовательно, любая переменная, которая не может принимать неотрицательные значения (например, заболеваемость, концентрация и пр.), распределена ненормально.

И параметрические, и непараметрические методы используются при проверке статистических гипотез. Общая схема следующая:

1. Формулируется статистическая гипотеза (нулевая гипотеза) о том, что никаких различий (связей и пр.) на самом деле нет¹. Например, что клиническая эффективность двух методов лечения одинакова.
2. Задается способ расчета величины D-отличия наблюдаемых данных от того, что ожидалось в предположении об истинности нулевой гипотезы. Например, модуль разности доли выживших больных при двух сравниваемых методах лечения.
3. Для фактических данных рассчитывается величина $D_{\text{факт}}$.
4. В предположении об истинности нулевой гипотезы рассчитывается вероятность того, что за счет случайных флюктуаций будет получена величина $D \geq D_{\text{факт}}$.
5. Если вероятность того, что $D \geq D_{\text{факт}}$ будет получено за счет случайных флюктуаций, слишком мала, то исходная нулевая гипотеза отвергается.

Например, критерий χ^2 проверяет статистическую гипотезу о равенстве нескольких наборов частот. Для него в качестве величины отличия Δ берется

$$\sum_{i,j} \frac{(N_{\text{факт}}(i,j) - N_{\text{ожд}}(i,j))^2}{N_{\text{ожд}}(i,j)}$$

¹ Иногда проверяют гипотезы не о равенстве двух величин, а о том, что одно не меньше другого, например что результаты лечения дженериком не хуже, чем оригинальным препаратом. В подобных случаях говорят об односторонних доверительных интервалах и односторонней достоверности различий.

где $N_{\text{факт}}(i < j)$ – количество наблюдений i -го значения в j -й группе, а $N_{\text{ожд}}(i < j)$ – ожидаемое количество этих наблюдений в предположении о том, что частоты во всех группах совпадают.

Приведем пример.

Пусть из 80 мужчин с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в больнице умерло 11, а из 120 женщин – 7. Проверим гипотезу о равенстве внутрибольничной смертности мужчин и женщин с ОНМК.

Из 200 больных суммарно умерло 18, то есть летальность составила 9%. Следовательно, из 80 мужчин ожидаемое количество умерших равно: $80 \times 0,09 = 7,2$ при фактическом количестве умерших 11 и величине отличия фактического и ожидаемого количества

$$\frac{(N_{\text{факт}} - N_{\text{ожд}})^2}{N_{\text{ожд}}} = \frac{(11 - 7,2)^2}{7,2} \approx 2,0056.$$

Для 120 женщин ожидаемое количество умерших: $120 \times 0,09 = 10,8$, и отличие фактического и ожидаемого количества

$$\frac{(7 - 10,8)^2}{10,8} \approx 1,337.$$

Ожидаемое количество выживших мужчин – 72,8 при фактическом количестве 69, что дает отличие

$$\frac{(69 - 72,8)^2}{72,8} \approx 0,1984.$$

Для женщин ожидаемое количество выживших составит 109,2 при фактическом количестве 113, отличие $2,0056 + 1,337 + 0,1985 + 0,1322 \approx 3,6732$

$$\frac{(113 - 109,2)^2}{109,2} \approx 0,1322.$$

Просуммировав полученные различия, получим $2,0056 + 1,337 + 0,1985 + 0,1322 \approx 3,6732$.

В приведенной выше схеме проверки статистических гипотез под пунктом 4 значится: «В предположении об истинности нулевой гипотезы рассчитывается вероятность того, что за счет случайных флюктуаций будет получена величина $D \geq D_{\text{факт}}$ ». Однако во многих случаях сделать это оказывается слишком сложным, и все, что удастся, – это получить способ расчета искомой вероятности с погрешностью, которая уменьшается при увеличении объема наблюдений. Подобные статистические критерии называются асимптотическими, в отличие от «точных критериев», в которых это вероятность определяется без погрешностей и вне зависимости от объема наблюдений.

Поэтому при использовании асимптотических критериев, кроме расчета величины статистической достоверности p , нужно проверять, можно ли этим критерием пользоваться, то есть не слишком

ли велика погрешность расчета асимптотического p при имеющемся объеме и характере данных.

Критерий χ^2 – асимптотический. Определение статистической достоверности² различий основано на том, что в случае истинности нулевой гипотезы при увеличении объема наблюдений суммарная величина отличий стремится к χ_n^2 -распределению с n степенями свободы, где $n = (m - 1)(k - 1)$, m – число сравниваемых групп, k – число разных вариантов значений. Например, для рассмотренного выше примера сравниваемых групп – мужчины и женщины – , вариантов значения тоже два (умер и выжил), следовательно, число степеней свободы равно $(2 - 1)(2 - 1) = 1$.

χ_n^2 -распределение, в частности, затабулировано в Excel, так что для приведенного примера получаем, что вероятность того, что χ_1^2 -распределение с 1 степенью свободы меньше или равно 3,6732, равно 0,9447. Следовательно, статистическая достоверность различий $p = 0,05529$, то есть с $p = 0,05$ различия летальности недостоверны и исходная гипотеза не может быть отвергнута.

Так как асимптотические критерии рассчитывают p с погрешностью, то нужно еще проверить, можно ли им пользоваться. Для критерия χ^2 при $p = 0,05$ им можно практически пользоваться, если общее число наблюдений не менее 50, а минимальное число ожидаемых количеств любой комбинации – не менее 5 – 7. В нашем случае общее число наблюдений составило 200, а минимальное ожидаемое количество (ожидаемое число умерших мужчин) составило 7,2, то есть пользоваться критерием можно.

Однако для таблиц «2 на 2», кроме асимптотического критерия χ^2 , есть и точный критерий, которым можно пользоваться вне зависимости от объема наблюдений. Программа, которая рассчитывает точное значение p , размещена в виде интернет-сервиса (<http://1mgmu.com/prog1/xi2.aspx>). Ее использование для рассмотренного примера дает величину 0,0493, то есть на самом деле при $p = 0,05$ различия статистически достоверны.

Критерий χ^2 позволяет сравнивать частоты встречаемости значений в нескольких группах, однако он ориентирован на работу с категориальными показателями, то есть со случайными величинами, имеющими несколько несравнимых друг с другом значений. При определении достоверности различий используются только частоты отдельных значений, а не сами значения. Например, если анализировать распределение пациентов мужского и женского пола по возрасту, то все разные значения возраста будут считаться различающимися в одинаковой степени. В частности, различия возрастов в 17 и 18 лет будут считаться такими же существенными, как в 17 и 70. Поэтому при анализе истинно числовых случайных величин обычно ис-

пользуются другие статистические критерии, а для их описания применяют не частоты отдельных значений, а параметры или функция распределения.

Статистический параметр случайной величины – число, описывающее какую-то характеристику распределения. Наиболее популярные параметры: математическое ожидание (среднее арифметическое), дисперсия (средний квадрат отклонения от среднего), среднеквадратичное отклонение³ (квадратный корень из дисперсии), мода (самое частое значение) и медиана (половина значений случайной величины должна быть больше медианы и половина – меньше).

Функция распределения $F_\xi(x) = P(\xi \leq x)$ случайной величины x определяется равенством $F_\xi(x) = P(A)$, где $P(A)$ – вероятность события A . Например, если χ – распределение по продолжительности жизни, то $F_\xi(x)$ – доля умерших в возрасте x или менее, то есть $1 - F_\xi(x)$ – вероятность прожить больше x (рис. 1).

Функция распределения полностью определяет распределение числовой случайной величины, так что если две случайные величины имеют одинаковые функции распределения, то и все параметры их тоже равны.

Удобство функции распределения заключается в том, что ее можно использовать как для дискретных случайных величин (то есть имеющих только несколько возможных значений), так и для непрерывных случайных величин (которые принимают бесконечное количество неповторяющихся значений).

Гипотезу о том, что две дискретные случайные величины распределены одинаково, можно проверять при помощи критерия χ^2 , а гипотезу о равенстве функций распределения двух непрерывных случайных величин – при помощи критерия Колмогорова–Смирнова. Оба эти критерия – непараметрические⁴. Критерий Колмогорова–Смирнова – точный, то есть при его применении не надо беспокоиться о достаточности числа наблюдений. При этом у него есть также и асимптотический аналог, и современные пакеты статистических программ сами определяют, нужно ли проводить расчеты для точного варианта или достаточно асимптотического.

Для непрерывных случайных величин, кроме функции распределения, используется также и плотность распределения – производная от функции распределения. Она показывает удельную частоту встречаемости данного и близких значений. Например, для нормально распределенных случайных величин с математическим ожиданием M и дисперсией D плотность распределения равна

$$p_\xi(x) = \frac{dF_\xi(x)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi D}} e^{-\frac{(x-M)^2}{2D}}$$

³ В англоязычной литературе этот параметр называется «standard deviation», что провоцирует неправильное обозначение его как «стандартное отклонение».

⁴ Обсуждение этого понятия будет ниже

² Или статистической значимости. Эти термины сейчас используются как синонимы, хотя с этим не все согласны.

Рисунок 1.
Функция распределения по ожидаемой продолжительности жизни в современной России





Рисунок 2.
Функция плотности распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием 5 и дисперсией 1



При анализе фактических данных аналогом графика функции плотности распределения является частот-

ная гистограмма, а аналогом функции плотности распределения – диаграмма частот нарастающим итогом.

При проверке статистических гипотез о величине математического ожидания и дисперсий по имеющемуся набору наблюдений x_1, \dots, x_N рассчитывают их оценки:

$$\bar{x}_N = \frac{x_1 + \dots + x_N}{N} \text{ и }^5$$

$$S_N = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2}{N-1}.$$

Тогда, если наблюдаемые случайные величины распределены нормально, то \bar{x}_N тоже распределено нормально,

$$\frac{\bar{x}_N}{\sqrt{S_N}}$$

распределено как распределение Стьюдента с $N - 1$ степенью свободы, S_N распределено как

$$\frac{D \cdot \chi_{N-1}^2}{N-1},$$

где D – дисперсия наблюдаемой случайной величины, отношение двух оценок дисперсий, сделанных по разным наборам наблюдений, имеет распределение Фишера–Снедекора, и так далее.

Однако если исходная величина распределена ненормально, то распределение всех указанных оценок не совпадает с указанными. Если бы было точно известно распределение наблюдаемой величины, то можно было бы рассчитать функции распределения всех этих оценок, но так как наблюдаемая величина априори распределена неизвестно как, то кажется, что данная задача не имеет удовлетворительного решения. Но «основной частью» большинства оценок является сумма наблюдений, и тут на помощь приходит классический результат под названием «Центральная предельная теорема», которая говорит о том, что при достаточно большом количестве наблюдений среднее арифметическое распределено нормально. В этом случае, если все равно, как распределена исходная случайная величина, можно делать вид, что она распределена нормально. В этом и состоит суть параметрической статистики – мы работаем со случайными величинами так, как будто они нормально распределены. В этом случае для описания их распределения достаточно знать величины двух параметров – среднего арифметического и дисперсии.

Следовательно, все методы параметрической статистики являются асимптотическими и для их корректного использования нужно знать, какое количество наблюдений необходимо и какова ве-

личина погрешности расчета достоверности различий, то есть корректно применять центральную предельную теорему. В ряде источников она приводится в следующей вульгарной формулировке: «если число наблюдений 30 или более, то их среднее арифметическое распределено нормально». Это неверно⁶. Для того, чтобы точно сформулировать центральную предельную теорему, определим количественную меру отклонения распределения от нормального.

Определение. Пусть ξ – числовая случайная величина с математическим ожиданием M и дисперсией D , а η – нормально распределенная с теми же математическим ожиданием M и дисперсией D . Тогда в качестве меры «сумасшествия» ρ возьмем величину

$$\rho(\xi) = \max_x |F_\xi(x) - F_\eta(x)|$$

Данное определение корректно, так как из него следует, что случайная величина имеет нулевую меру «сумасшествия» тогда и только тогда, когда она распределена нормально.

Правильная формулировка центральной предельной теоремы. Пусть x_1, x_2, \dots – независимые наблюдения случайной ξ -величины с математическим ожиданием M и дисперсией D , а

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n),$$

то есть среднее арифметическое из n наблюдений. Тогда при $n \rightarrow \infty$ $\rho(\bar{x}_n) \rightarrow 0$.

Заметим, что в формулировке теоремы нет никаких равномерных оценок – сколько нужно наблюдений для получения той или другой величины близости распределения среднего арифметического к нормальному. Более того, таких оценок нет в принципе – скорость сходимости к нормальному распределению индивидуальна для каждой случайной величины и для любого заранее взятого количества наблюдений (хоть тысячи, хоть миллиона, хоть миллиарда) найдется случайная величина, для которой при этом числе наблюдений распределение среднего арифметического далеко от нормального.

Есть утверждения о том, что скорость сходимости среднего арифметического к нормальному распределению зависит от степени некомпактности распределения, количественной мерой которого является коэффициент эксцентриситета (или эксцесса). То, что для практической близости среднего арифметического к нормальному распределению достаточно 30 наблюдений, верно (в определенной степени) для случайных величин с коэффициентом эксцентриситета не более нескольких единиц⁷.

⁵ То, что в оценке сумма квадратов делится не на N , а на $N - 1$, связано с тем, что рассчитывается квадрат отклонения не от неизвестного «истинного» среднего арифметического, а от его оценки, полученной по тому же набору наблюдений, что занижает величину отклонения. В ряде источников указывается, что если число наблюдений более 30, то делить надо не на $N - 1$, а на N . Это ошибка – делить надо всегда только на $N-1$.

⁶ Ряд авторов, пытаясь писать для медиков «более доходчиво, пусть даже в ущерб математической строгости», злоупотребляют упрощениями.

⁷ Вопрос о том, как проверять скорость сходимости распределения среднего арифметического к нормальному для случайных величин с большим коэффициентом эксцентриситета, требует изложения в отдельной работе.

понятны. А если в результате использования получено, что средний ранг АДС на препарате «А» – 573,3, а на препарате «Б» - 709,1, то содержательная ценность этого результата без длительных дополнительных расшифровок сомнительна.

При переходе от исходных значений к рангам значительная часть исходной информации пропадает бесследно, так как ранги значений указывают лишь на то, какое значение больше, но не указывают, на сколько больше.

Поэтому ранговые методы, или методы непараметрической статистики, следует использовать для подстраховки. Например, если из-за недостаточного размера групп или большого коэффициента эксцентриситета корректно сравнить средние по группам нельзя, можно рассчитать достоверность различия средних рангов.

Выводы

1. Методы параметрической статистики рассчитывают p с погрешностью, зависящей как от числа наблюдений, так и от характера распределения наблюдаемой случайной величины.
2. Часто встречающееся утверждение о том, что можно использовать методы параметрической статисти-

стики при числе наблюдений от 30, верно только для случайных величин с коэффициентом эксцентриситета (эксцесса) не более нескольких единиц.

3. Методы непараметрической статистики анализируют не исходные значения, а их ранги.
4. Методы параметрической статистики не зависят от формы распределения исследуемых случайных величин.
5. Все критерии параметрической статистики – асимптотические, то есть рассчитывают p с погрешностью, уменьшающейся при увеличении числа наблюдений.
6. Среди методов непараметрической статистики есть как точные критерии, правильно рассчитывающие p вне зависимости от числа наблюдений, так и асимптотические.
7. При применении методов непараметрической статистики для анализа истинно числовых случайных величин ценность полученных результатов не очень велика, так как при этом теряется информация о том, насколько одни значения больше других.

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 15-07-06947.

Литература

1. Киселев А.С. Краткая история формирования ряда областей медицинской науки и видов высокотехнологичной помощи для взрослых пациентов. Сеченовский вестник. 2014; 16 (4): 2 – 14.
2. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. Москва: МИА; 2007: 480.

References

1. Kiselev A.S. Brief history of the formation of a number of areas of medical science and types of high-tech care for adult patients. Sechenovsky Gazette. 2014; 16 (4): 2 – 14.
2. Gerasimov A.N. Medical statistics. Moscow: MIA; 2007: 480.